



# Razones para dejar a los niños enfermos en casa

Su hijo debe quedarse en casa si tiene alguna enfermedad que pueda contagiar a los demás estudiantes. Los niños que están enfermos tienen dificultades para participar en clase y aprender.

<p><b><u>Fiebre</u></b> Los niños con fiebre de 100.4°F o más deben permanecer en casa hasta que no tengan fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos que bajan la fiebre. Si usted le da medicamento para bajar la fiebre antes de ir a la escuela, la fiebre puede regresar y su hijo puede contagiar a los demás estudiantes.</p>	<p><b><u>Diarrea</u></b> Un evento de defecación suelta o aguada es razón suficiente para que su hijo permanezca en casa. Si el estudiante con diarrea tiene también fiebre, sarpullido o se siente débil, tal vez necesita llevarlo con su doctor.</p>	<p><b><u>Vómito</u></b> Su hijo debe quedarse en casa si ha vomitado dos veces en las últimas 24 horas. El estudiante podrá regresar a la escuela si los síntomas desaparecen o cuando su médico le indique que ya no hay riesgo de contagios.</p>	<p><b><u>Conjuntivitis</u></b> Si su hijo tiene los ojos rojos y una secreción ocular amarillenta o turbia, debe quedarse en casa hasta que desaparezcan los síntomas o una vez que comience un tratamiento.</p>
<p><b><u>Tos Persistente</u></b> Si la tos de su hijo es más severa de lo que es un resfriado común, necesita quedarse en casa. Si su hijo tiene un resfriado leve, está bien que vaya a la escuela. Si tiene dificultad para respirar o tiene fiebre, llame a su doctor.</p>	<p><b><u>Dolor de garganta</u></b> Si su estudiante tiene dolor de garganta y fiebre o dolor de garganta severo sin fiebre, debe quedarse en casa. Si su hijo tiene un inicio rápido de fiebre y dolor de garganta sin síntomas de resfriado, llame a su doctor inmediatamente.</p>	<p><b><u>Dolor de oído persistente</u></b> Si el dolor de oído es severo, el estudiante debe quedarse en casa. Si el dolor es leve y no tiene dificultad en concentrarse o poner atención en clase, puede ir a la escuela.</p>	<p><b><u>Varicela</u></b> Su hijo debe permanecer en casa hasta que todas las ampollas/granos hayan formado costras y hasta que hayan pasado dos días sin ampollas nuevas. Ya que la mayoría de los estudiantes han recibido vacunas contra la varicela, llame a su doctor si tiene alguna pregunta acerca de este diagnóstico.</p>
<p><b><u>Dolor de estómago</u></b> Si su hijo se queja de dolor de estómago y le dice que le duele al moverse y no puede comer, el estudiante se debe quedar en casa. Si esto continua siendo un problema tal vez necesita llamar a su doctor.</p>	<p><b><u>Sarna</u></b> Si su hijo tiene sarna, debe quedarse en casa durante 24 horas después del tratamiento. La sarna es una enfermedad contagiosa causada por un ácaro. Sentirá picazón y sarpullido.</p>	<p><b><u>Piojos</u></b> Si su hijo tiene piojos vivos, deberá quedarse en casa y recibir tratamiento, asegurándose de eliminar todos los piojos vivos. Deberá eliminar liendres diariamente según sea necesario. Comuníquese con su escuela para más información.</p>	<p><b><u>Impétigo</u></b> Si su hijo tiene impétigo (llagas rojizas, las llagas revientan y producen costras color miel en el cuerpo o en la cara), debe permanecer en casa hasta que las lesiones activas hayan desaparecido o 24 horas después de empezar tratamiento con antibióticos.</p>

- Cuando tenga alguna duda en mandar a su estudiante a la escuela, consulte a su pediatra.
- Asegúrese que la escuela sepa cómo comunicarse con usted durante el día. Recuerde mantener su información telefónica actualizada durante todo el año escolar.

Recursos:  
Children's Healthcare of Atlanta  
American Academy of Pediatrics

Rev.05/2017